

- ००.००.०००० ०० ००००० ०००००००० ००००० ००० ००००० **ज** गर्भवती महिलेची टेस्ट पॉझिटिव्ह आली तर असे कही उपचार उपलब्ध आहेत, ज्यामुळे बाळाला होणारी लागण टळू शक्ते. सझिरीयन प्रकरे डलिव्हरी करण्यामुळे देखलि बाळाला होणारी लागण टळू शक्ते.
- ०००००० ०००००० ०००००००० ००० ००००० **?** आईकडून मुलाला संक्रमण हे रक्तातुन, जन्माच्या वेळी क्वी स्तनपानातुन देखलि होऊ शक्ते.
- ००००० ०००००००० ००००००००० ००.००.०००० ०००००००० ००००० ००००० **पू** सर्व गर्भवती महलिांची टेस्ट व्हायची नाहे, त्यांच्या संमती शवाय त्यांची टेस्ट केली जायची नाही. परंतु आता सर्व गर्भवती महलिांसाठी **च.आय.व्ही. टेस्ट** करणे सक्तीचे केल्ले आहे.
- ००.००.०००० ०० ००००० ०००००० ००० ०००००० **?** च.आय.व्ही ची चाचणी करण्यापुरवी ह्या टेस्ट बददल त्या व्यक्तीला माहलिती दलिी जाते. समूपदेशन केल्ले जाते. नंतर तलिा टेस्ट करायची की नाही हे ठरवावे लागते. टेस्ट नंतर **क** आठवड्याच्या कलावधीत नकिल मळितो. **च.आय.व्ही** टेस्टसाठी हातातुन थोडे रक्त घेतले जाते. ही टेस्ट कोणत्याही वेळी केली जाते.
- ०० ००००० ०००००००००० ००० ०० ००० ००००० **ज** टेस्ट पॉझिटिव्ह आली तर बर् **याच** स्त्रया बाळाला जन्म देण्याचा नरिणय घेतात तर बर् **याच** स्त्रया गर्भपात करण्याचा नरिणय घेतात.